

No artigo “Saúde mental dos trabalhadores da saúde pública em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul”, DOI: 10.5327/Z1679443520180196, publicado no periódico Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, 2018;16(2):145-57.

**Onde se lia:**

**Tabela 1.** Fatores sociodemográficos, aspectos de saúde e indicadores de saúde mental: transtornos mentais comuns e ideação suicida, Bento Gonçalves, 2017 (n=567)\*\*.

Variável	Amostra n (%)	TMC n (%)	Ideação suicida n (%)
Total	597 (100%)	102 (20,3%)	68 (11,6%)
Sexo		p=0,08	p=0,09 <sup>(b)</sup>
Masculino	107 (18,7)	13 (13,3)	7 (6,7)
Feminino	466 (81,3)	85 (21,2)	58 (12,6)
Faixa etária (anos)		p=0,07	p=0,82
Até 25	76 (13,2)	22 (32,8)	10 (13,3)
26 a 35	218 (37,8)	34 (18,2)	23 (10,8)
36 a 45	144 (25,0)	22 (18,8)	16 (11,3)
46 e mais	139 (24,1)	22 (19,0)	19 (13,9)
Estado civil		p=0,72	p=0,06
Casado/acompanhado	361 (61,4)	58 (19,3)	40 (11,3)
Solteiro	175 (29,8)	31 (20,4)	16 (9,2)
Separado/divorciado/viúvo	52 (8,8)	11 (24,4)	11 (21,2)
Escolaridade (anos)		p=0,70	p=0,002*
11 (ensino médio)	231 (39,8)	38 (20,5)	39 (17,5)
12 a 15	201 (34,7)	33 (19,1)	17 (8,5)
16 e mais	148 (25,5)	31 (23,0)	11 (7,5)
Tabagismo		p=0,43	p=0,03
Nunca fumou	443 (75,6)	74 (19,2)	43 (9,8)
Ex-fumante	57 (9,7)	13 (26,5)	11 (19,3)
Fumante	86 (14,7)	15 (22,7)	14 (16,7)
Atividade física		p=0,72	p=0,21*
Não	334 (59,1)	61 (21,6)	43 (13,3)
Até duas horas/semana	74 (13,1)	12 (19,0)	9 (12,5)
3 horas/semana ou mais	157 (27,8)	26 (18,4)	14 (8,9)
Doença crônica		p<0,001	p=0,01
Sim	461 (79,9)	63 (16,2)	43 (9,5)
Não	116 (20,1)	33 (33,3)	20 (17,5)
Remédios controlados		p<0,001	p<0,001
Não usa	485 (81,6)	64 (15,3)	40 (8,4)
Usa	109 (18,4)	38 (45,8)	28 (25,7)

TMC: transtornos mentais comuns; p conforme teste  $\chi^2$ ; \*teste de tendência linear; \*\*foram excluídos dados ignorados.

**Tabela 4.** Análise multivariada: fatores associados com transtornos mentais comuns (TMC) e ideação suicida, Bento Gonçalves, 2017 (n=567).

Variáveis	TMC		Ideação suicida	
	RP bruta (IC)	RP ajustada (IC)	RP bruta (IC)	RP ajustada (IC)
Sexo	p=0,09	p=0,17	p=0,10	p=0,28
Masculino	1	1	1	1
Feminino	1,60 (0,93 - 2,75)	1,45 (0,85 - 2,49)	1,88 (0,88 - 3,99)	1,52 (0,72 - 3,24)
Faixa etária (anos)	p=0,05	p=0,03	p=0,82	----
Até 25	1	1	1	
26 a 35	0,55 (0,35 - 0,88)	0,53 (0,27 - 0,83)	0,81 (0,41 - 1,62)	
35 a 45	0,57 (0,34 - 0,95)	0,48 (0,27 - 0,86)	0,85 (0,40 - 1,77)	
46 e mais	0,58 (0,35 - 0,96)	0,47 (0,37 - 0,94)	1,04 (0,51 - 2,12)	
Escolaridade (anos)	p=0,70	-----	p=0,004*	p=0,002*
11 (ensino médio)	1		1	1
12 a 15	0,93 (0,61 - 1,41)		0,49 (0,28 - 0,83)	0,50 (0,28 - 0,89)
16 e mais	1,12 (0,74 - 1,70)		0,43 (0,23 - 0,81)	0,44 (0,23 - 0,83)
Estado civil	p=0,72	---	p=0,05	p=0,07
Casado/Acompanhado	1		1	1
Solteiro	1,06 (0,71 - 1,56)		0,82 (0,47 - 1,42)	0,95 (0,53 - 1,70)
Separado/viúvo	1,26 (0,72 - 2,22)		1,87 (1,02 - 3,40)	1,89 (1,06 - 3,38)
Vínculo: concurso	p=0,08	p=0,02	p=1,00	-----
Não	1	1	1	
Sim	1,38 (0,97 - 1,97)	1,60 (1,08 - 2,39)	1,00 (0,64 - 1,56)	
Tabagismo	p=0,42	-----	p=0,03	p=0,11
Nunca fumou	1		1	1
Ex-fumante	1,38 (0,83 - 2,30)		1,98 (1,08 - 3,61)	1,69 (0,89 - 3,21)
Fumante	1,18 (0,73 - 1,93)		1,71 (0,98 - 2,98)	1,63 (0,85 - 2,81)
Antiguidade	p=0,005	p=0,007	p=0,59	-----
Até 11 meses	1	1	1	
1 a <4 anos	2,37 (1,39 - 4,04)	2,25 (1,29 - 3,92)	1,56 (0,80 - 3,04)	
4 a <9 anos	1,60 (0,86 - 2,97)	1,36 (0,69 - 2,70)	1,52 (0,74 - 3,11)	
9 anos e mais	1,34 (0,73 - 2,47)	1,16 (0,54 - 2,51)	1,32 (0,66 - 2,67)	
Função	p<0,001	p<0,001	p<0,001	p=0,01
Técnico/auxiliar de enfermagem	1	1	1	1
Téc. bucal/RX/laboratorial	1,39 (0,48 - 4,06)	1,03 (0,24 - 4,45)	1,03 (0,37 - 2,90)	1,01 (0,39 - 2,63)
Médicos(as)	1,39 (0,63 - 3,07)	2,48 (1,03 - 5,95)	0,50 (0,19 - 1,33)	0,48 (0,15 - 1,57)
Enfermeiros(as)	1,77 (0,82 - 3,83)	1,56 (0,70 - 3,49)	0,46 (0,16 - 1,32)	0,40 (0,13 - 1,26)
Outros de nível superior	1,68 (0,76 - 3,69)	1,72 (0,82 - 3,62)	---	---
Administrativos	1,68 (0,83 - 3,37)	2,05 (1,00 - 4,20)	0,73 (0,35 - 1,50)	0,70 (0,32 - 1,52)
Fiscais/vigilâncias	3,16 (1,19 - 8,39)	2,43 (0,75 - 7,85)	2,50 (0,98 - 6,38)	2,26 (0,74 - 6,89)
Higienizadoras	3,03 (1,35 - 6,79)	3,84 (1,63 - 9,04)	2,11 (1,01 - 4,41)	1,70 (0,80 - 3,64)
ACS	3,96 (2,03 - 7,70)	7,43 (3,28 - 16,84)	1,94 (1,00 - 3,78)	1,88 (0,95 - 3,75)
Conflito c/ chefia	p<0,001	p<0,001	p=0,004	P<0,001
Não	1	1	1	1
Sim	2,65 (1,85 - 3,80)	3,13 (2,15 - 4,56)	2,10 (1,26 - 3,51)	2,40 (1,47 - 3,93)
Conflito com colega	p<0,001	p<0,001	p=0,001	p<0,001
Não	1	1	1	1
Sim	3,45 (2,45 - 4,84)	3,05 (2,11 - 4,40)	2,22 (1,36 - 3,62)	2,56 (1,57 - 4,20)
Conflito com usuário	p<0,001	p=0,001	p=0,02	p=0,002
Não	1	1	1	1
Sim	2,12 (1,47 - 3,05)	1,85 (1,28 - 2,68)	1,84 (1,11 - 3,06)	2,15 (1,34 - 3,47)

RP: razão de prevalência; IC: intervalo de confiança a 95%; RX: raio X; ACS: agentes comunitárias de saúde; \*teste de tendência linear; regressão examinou apenas associações com p=0,20; TMC ajustado para sexo, faixa etária, escolaridade, tipo de vínculo, antiguidade, função; ideação suicida ajustada para sexo, escolaridade, estado civil, tabagismo e função; <sup>a</sup>excluído da análise pelo número restrito.

**Leia-se:****Tabela 1.** Fatores sociodemográficos, aspectos de saúde e indicadores de saúde mental: transtornos mentais comuns e ideação suicida, Bento Gonçalves, 2017 (n=567)\*\*.

Variável	Amostra n (%)	TMC n (%)	Ideação suicida n (%)
Total	597 (100%)	102 (20,3%)	68 (11,6%)
Sexo		p=0,08	p=0,09 <sup>(b)</sup>
Masculino	107 (18,7)	13 (13,3)	7 (6,7)
Feminino	466 (81,3)	85 (21,2)	58 (12,6)
Faixa etária (anos)		p=0,07	p=0,82
Até 25	76 (13,2)	22 (32,8)	10 (13,3)
26 a 35	218 (37,8)	34 (18,2)	23 (10,8)
36 a 45	144 (25,0)	22 (18,8)	16 (11,3)
46 e mais	139 (24,1)	22 (19,0)	19 (13,9)
Estado civil		p=0,72	p=0,06
Casado/acompanhado	361 (61,4)	58 (19,3)	40 (11,3)
Solteiro	175 (29,8)	31 (20,4)	16 (9,2)
Separado/divorciado/viúvo	52 (8,8)	11 (24,4)	11 (21,2)
Escolaridade (anos)		p=0,70	p=0,002*
Até 11 (ensino médio)	231 (39,8)	38 (20,5)	39 (17,5)
12 a 15	201 (34,7)	33 (19,1)	17 (8,5)
16 e mais	148 (25,5)	31 (23,0)	11 (7,5)
Tabagismo		p=0,43	p=0,03
Nunca fumou	443 (75,6)	74 (19,2)	43 (9,8)
Ex-fumante	57 (9,7)	13 (26,5)	11 (19,3)
Fumante	86 (14,7)	15 (22,7)	14 (16,7)
Atividade física		p=0,72	p=0,21*
Não	334 (59,1)	61 (21,6)	43 (13,3)
Até duas horas/semana	74 (13,1)	12 (19,0)	9 (12,5)
3 horas/semana ou mais	157 (27,8)	26 (18,4)	14 (8,9)
Doença crônica		p<0,001	p=0,01
Sim	461 (79,9)	63 (16,2)	43 (9,5)
Não	116 (20,1)	33 (33,3)	20 (17,5)
Remédios controlados		p<0,001	p<0,001
Não usa	485 (81,6)	64 (15,3)	40 (8,4)
Usa	109 (18,4)	38 (45,8)	28 (25,7)

TMC: transtornos mentais comuns; p conforme teste  $\chi^2$ ; \*teste de tendência linear; \*\*foram excluídos dados ignorados.

**Tabela 4.** Análise multivariada: fatores associados com transtornos mentais comuns (TMC) e ideação suicida, Bento Gonçalves, 2017 (n=567).

Variáveis	TMC		Ideação suicida	
	RP bruta (IC)	RP ajustada (IC)	RP bruta (IC)	RP ajustada (IC)
Sexo	p=0,09	p=0,17	p=0,10	p=0,28
Masculino	1	1	1	1
Feminino	1,60 (0,93 - 2,75)	1,45 (0,85 - 2,49)	1,88 (0,88 - 3,99)	1,52 (0,72 - 3,24)
Faixa etária (anos)	p=0,05	p=0,03	p=0,82	----
Até 25	1	1	1	
26 a 35	0,55 (0,35 - 0,88)	0,53 (0,27 - 0,83)	0,81 (0,41 - 1,62)	
35 a 45	0,57 (0,34 - 0,95)	0,48 (0,27 - 0,86)	0,85 (0,40 - 1,77)	
46 e mais	0,58 (0,35 - 0,96)	0,47 (0,37 - 0,94)	1,04 (0,51 - 2,12)	
Escolaridade (anos)	p=0,70	-----	p=0,004*	p=0,002*
Até 11 (ensino médio)	1		1	1
12 a 15	0,93 (0,61 - 1,41)		0,49 (0,28 - 0,83)	0,50 (0,28 - 0,89)
16 e mais	1,12 (0,74 - 1,70)		0,43 (0,23 - 0,81)	0,44 (0,23 - 0,83)
Estado civil	p=0,72	---	p=0,05	p=0,07
Casado/Acompanhado	1		1	1
Solteiro	1,06 (0,71 - 1,56)		0,82 (0,47 - 1,42)	0,95 (0,53 - 1,70)
Separado/viúvo	1,26 (0,72 - 2,22)		1,87 (1,02 - 3,40)	1,89 (1,06 - 3,38)
Vínculo: curso	p=0,08	p=0,02	p=1,00	-----
Não	1	1	1	
Sim	1,38 (0,97 - 1,97)	1,60 (1,08 - 2,39)	1,00 (0,64 - 1,56)	
Tabagismo	p=0,42	-----	p=0,03	p=0,11
Nunca fumou	1		1	1
Ex-fumante	1,38 (0,83 - 2,30)		1,98 (1,08 - 3,61)	1,69 (0,89 - 3,21)
Fumante	1,18 (0,73 - 1,93)		1,71 (0,98 - 2,98)	1,63 (0,85 - 2,81)
Antiguidade	p=0,005	p=0,007	p=0,59	-----
Até 11 meses	1	1	1	
1 a <4 anos	2,37 (1,39 - 4,04)	2,25 (1,29 - 3,92)	1,56 (0,80 - 3,04)	
4 a <9 anos	1,60 (0,86 - 2,97)	1,36 (0,69 - 2,70)	1,52 (0,74 - 3,11)	
9 anos e mais	1,34 (0,73 - 2,47)	1,16 (0,54 - 2,51)	1,32 (0,66 - 2,67)	
Função	p<0,001	p<0,001	p<0,001	p=0,01
Técnico/auxiliar de enfermagem	1	1	1	1
Téc. bucal/RX/laboratorial	1,39 (0,48 - 4,06)	1,03 (0,24 - 4,45)	1,03 (0,37 - 2,90)	1,01 (0,39 - 2,63)
Médicos(as)	1,39 (0,63 - 3,07)	2,48 (1,03 - 5,95)	0,50 (0,19 - 1,33)	0,48 (0,15 - 1,57)
Enfermeiros(as)	1,77 (0,82 - 3,83)	1,56 (0,70 - 3,49)	0,46 (0,16 - 1,32)	0,40 (0,13 - 1,26)
Outros de nível superior	1,68 (0,76 - 3,69)	1,72 (0,82 - 3,62)	---	---
Administrativos	1,68 (0,83 - 3,37)	2,05 (1,00 - 4,20)	0,73 (0,35 - 1,50)	0,70 (0,32 - 1,52)
Fiscais/vigilâncias	3,16 (1,19 - 8,39)	2,43 (0,75 - 7,85)	2,50 (0,98 - 6,38)	2,26 (0,74 - 6,89)
Higienizadoras	3,03 (1,35 - 6,79)	3,84 (1,63 - 9,04)	2,11 (1,01 - 4,41)	1,70 (0,80 - 3,64)
ACS	3,96 (2,03 - 7,70)	7,43 (3,28 - 16,84)	1,94 (1,00 - 3,78)	1,88 (0,95 - 3,75)
Conflito c/ chefia	p<0,001	p<0,001	p=0,004	P<0,001
Não	1	1	1	1
Sim	2,65 (1,85 - 3,80)	3,13 (2,15 - 4,56)	2,10 (1,26 - 3,51)	2,40 (1,47 - 3,93)
Conflito com colega	p<0,001	p<0,001	p=0,001	p<0,001
Não	1	1	1	1
Sim	3,45 (2,45 - 4,84)	3,05 (2,11 - 4,40)	2,22 (1,36 - 3,62)	2,56 (1,57 - 4,20)
Conflito com usuário	p<0,001	p=0,001	p=0,02	p=0,002
Não	1	1	1	1
Sim	2,12 (1,47 - 3,05)	1,85 (1,28 - 2,68)	1,84 (1,11 - 3,06)	2,15 (1,34 - 3,47)

RP: razão de prevalência; IC: intervalo de confiança a 95%; RX: raio X; ACS: agentes comunitárias de saúde; \*teste de tendência linear; regressão examinou apenas associações com p=0,20; TMC ajustado para sexo, faixa etária, escolaridade, tipo de vínculo, antiguidade, função; ideação suicida ajustada para sexo, escolaridade, estado civil, tabagismo e função; <sup>a</sup>excluído da análise pelo número restrito.